

СХЕМА ИММУНИЗАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

До тех пор, пока в мире не останется ни одного ребенка, инфицированного полиомиелитом, риску заражения этой болезнью будут подвергаться дети во всех странах. Полиовирус легко импортируется в страну, свободную от полиомиелита, и может быстро распространиться среди неиммунизированных групп населения.

Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации.

Прививки против полиомиелита входят в календарь профилактических прививок Российской Федерации.

СХЕМА ИММУНИЗАЦИИ:

- вакцинация состоит из трех прививок и проводится детям в возрасте 3, 4, 5 и 6 месяцев с использованием инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ) для первых двух вакцинальных прививок и оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ) для третьей вакцинальной прививки;

- ревакцинация состоит также из 3 прививок и проводится детям в возрасте 18 месяцев, 20 месяцев и 14 лет с использованием оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ).

Дети и взрослые, выезжающие или въезжающие в страны, где регистрируются случаи полиомиелита, должны быть привиты против этой инфекции.

Кроме того, с целью профилактики полиомиелита необходимо:

- соблюдать правила личной гигиены (мытьё рук);
- свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой сполоснуть кипяченой или бутилированной водой.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА Памятка для населения

ПОЛИОМИЕЛИТ - это вирусное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее полный паралич. Вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике. Первоначальными симптомами являются высокая температура, усталость, головная боль, тошнота, ригидность шеи и боль в конечностях. Один из 200 случаев инфицирования приводит к необратимому параличу (обычно ног). Из таких парализованных 5%–10% умирают в результате иммобилизации дыхательной мускулатуры.



ГРУППА ПОВЫШЕННОГО РИСКА.


Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет.

ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ являются больные и вирусоносители. Выделение вируса из глотки и с фекалиями начинается в инкубационный период, который продолжается в среднем 5-12 дней (возможны колебания от 2 до 35 дней). После появления первых симптомов заболевания вирус продолжает выделяться с фекалиями, в 1 г которых содержится до 1 млн. инфекционных доз. Поэтому главное значение имеет фекально-оральный механизм передачи инфекции через загрязненные фекалиями воду и пищевые продукты. В эпидемических очагах может происходить инфицирование людей воздушно-капельным путем.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ПОЛИОМИЕЛИТА

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- высокая температура
- усталость
- головная боль
- тошнота
- боль в конечностях



РОДИТЕЛИ! ВНИМАНИЕ!

Если у ребенка возникли жалобы на снижение опоры на ноги, нарушение походки (часто спотыкается, «тянет ногу», «шлепает» ею), немедленно проконсультируйте его у невролога.

Своевременное обращение к врачу – залог успешного лечения и быстрого выздоровления.



ЭНДЕМИЧНЫМИ странами по полиомиелиту являются Нигерия, Афганистан и Пакистан.

Случаи полиомиелита регистрируются в таких странах как Таджикистан, Сенегал, Либерия, Мали, Сьерра Леоне, Мавритания, Непал, Чад, КНР и др.